

Tamaño Hasta 4,2 metros.

Cabeza algo cuadrangular.


Aleta dorsal muy pequeña, redondeada y curvada, situada en el tercio posterior del cuerpo.

Mancha blanquecina vertical a ambos lados de la cabeza entre el ojo y la aleta pectoral que se conoce como "agalla falsa".

Aletas pectorales cortas.

Cachalote pigmeo

Kogia breviceps



DESCRIPCIÓN

A diferencia del cachalote enano (*Kogia sima*), el cachalote pigmeo es más grande y robusto. Color gris oscuro o marrón, con el vientre más claro. Habita en aguas profundas, generalmente más allá del borde de la plataforma continental.

SOPLO



Es sutil y difícil de avistar



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Amenazas

Enredos en redes de pesca



Colisiones con embarcaciones



Contaminación marina



ECOLOGÍA

Alimentación:


principalmente calamares, aunque también consume peces y crustáceos como camarones y cangrejos.

Comportamiento: lento y cauteloso; suele descansar en superficie con la cabeza expuesta y la cola sumergida. Forma grupos reducidos (5-6 individuos) y es indiferente a las embarcaciones. Ante amenazas, se zambulle dejando una estela de materia fecal para despistar a los enemigos.



DISTRIBUCIÓN

En España: es común en Canarias, con avistamientos y varamientos frecuentes. En la cornisa cantábrica y Galicia se considera especie autóctona de presencia ocasional, mientras que en el mediterráneo su distribución es esporádica.



DATOS CURIOSOS

Durante mucho tiempo, esta especie representaba los habitantes ocultos de los océanos profundos. Su aspecto compacto y comportamiento reservado la han mantenido al margen de la cultura popular marina.