

 **Tamaño** Hasta 4,1 metros.

Cabeza abultada y cuadrangular.

Morro poco visible.

Aleta dorsal grande y curvada.

Cuerpo robusto y de color gris, con vientre más blanco.

Aletas pectorales largas y estrechas.

Calderón gris
Grampus griseus

DESCRIPCIÓN

Es el más diferente de las tres especies, es muy fácil de distinguir por su tamaño más pequeño, cabeza globosa y por tener el cuerpo repleto de cicatrices por roce con otros ejemplares. Reciben el nombre de "ballenas piloto"; ballena, por su tamaño y su cabeza globosa, piloto porque los grupos suelen estar liderados por un macho adulto.

SOPLO



ESTADO DE CONSERVACIÓN

 Incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.



ECOLOGÍA


Alimentación: principalmente de calamares. 

Comportamiento: muy social (3-50 ejemplares) y activo en superficie. Suelen levantar la cabeza y parte del cuerpo verticalmente fuera del agua para observar lo que ocurre a su alrededor y golpean el agua con las aletas. Suele ignorar las embarcaciones, caza en formación y realiza inmersiones de hasta 30 minutos.



DISTRIBUCIÓN

En España abunda mayoritariamente en el Atlántico, se localiza sobre todo en costas del noreste de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, pero también tiene presencia en las costas noratlánticas y mediterráneas, como la zona de cañones submarinos de Cataluña.



Amenazas

Ruido submarino



Enredos en redes de pesca



Contaminación marina



DATOS CURIOSOS



Reconocible por sus cicatrices, las interacciones sociales y la caza en profundidad, el calderón gris ha sido percibido por navegantes como un habitante enigmático del talud continental, menos visible pero constante en aguas profundas. Aunque se llamen "ballenas" (las ballenas verdaderas poseen barbas para filtrar alimento), los calderones son delfínidos (odontocetos, cetáceos con dientes).