

 **Tamaño** Hasta 10 metros.

Cabeza cuadrangular y abultada en machos

Morro en forma de pico.

Aletas pectorales pequeñas.

Coloración marrón o negra, más clara en la zona ventral.

Aleta dorsal pequeña y curvada hacia atrás.

Dorso pocas cicatrices.

Zifio calderón boreal
Hyperoodon ampullatus



DESCRIPCIÓN

Con un cuerpo parecido al del delfín, esta especie presenta un melón bien marcado en la cabeza con un pico prominente más claro que el resto del cuerpo.

SOPLO



ESTADO DE CONSERVACIÓN

 Incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.



ECOLOGÍA


Alimentación: principalmente calamares,  ocasionalmente peces  y otros invertebrados.

Comportamiento: forman pequeños grupos de hasta 4 miembros, que suelen estar separados por sexos. Es capaz de bucear entre 14 y 70 minutos sin respirar. Sus inmersiones son profundas, pero probablemente no cubre largas distancias durante ese tiempo.



DISTRIBUCIÓN

En España no es rara en el Cantábrico y en las islas Canarias.



Amenazas

Ruido submarino



Contaminación marina



DATOS CURIOSOS

Con su gran tamaño y frente prominente, este zifio fue conocido históricamente por balleneros del Atlántico norte, siendo una de las pocas especies de zifios reconocidas antes del desarrollo de la biología marina moderna.