

Tamaño Hasta 4,7 metros.

Mandíbula inferior arqueada, machos con dos colmillos

Dorso con cicatrices de luchas.

Aleta dorsal pequeña, situada en la parte posterior.

Aletas pectorales muy pequeñas.


Coloración gris oscuro azulado o marrón grisáceo, vientre más claro con las zonas ventrales más claras en áreas cercanas a garganta, aletas, ombligo y genitales.

Zifio de Blainville
Mesoplodon densirostris

DESCRIPCIÓN

Cetáceo robusto e hidrodinámico, ligeramente comprimido lateralmente, con un rostro prominente y dos surcos en la garganta que utiliza para succionar alimento. Conocido también como *Zifio de pico denso*, una traducción de su nombre científico densirostris que hace referencia directa a su característica física más única, el pico.

SOPLO



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.



ECOLOGÍA


Alimentación: principalmente calamares  aunque también consumen grandes cantidades de otros invertebrados y peces. 

Comportamiento: suelen formar grupos muy unidos, de 3 a 7 individuos, raramente con dos machos. Son acústicamente activos entre el 18 y 25% de ese tiempo, posiblemente para evitar a las orcas. Su presencia en superficie es breve, con una media de 2 minutos, alrededor del 90% del tiempo están sumergidos.



DISTRIBUCIÓN

En España, se encuentra sobre todo en Canarias donde es una de las especies de zifios más comunes. Se considera residente en las islas de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.



Amenazas

Ruido submarino



Colisiones con embarcaciones



Contaminación marina



DATOS CURIOSOS

Durante siglos, los zifios fueron considerados "fantasmas del océano" por su extrema discreción y raras apariciones en superficie. El zifio de Blainville, con sus cicatrices y colmillos visibles en los machos, ha sido interpretado como testimonio silencioso de una vida oculta en los grandes abismos.