

 **Tamaño** Hasta 5,5 metros.

Aleta dorsal pequeña situada hacia la parte trasera del cuerpo.

Cabeza con frente cuadrada.

Morro recto, sin pliegues, largo y delgado.

Aletas pectorales pequeñas.

Coloración gris oscuro o gris azulado, aclarándose hacia el vientre.

Zifio de sowerby
Mesoplodon bidens



DESCRIPCIÓN

De cuerpo parecido a un delfín, posee una frente ligeramente abultada. Los machos adultos tienen dos dientes triangulares visibles incluso con la boca cerrada y presentan cicatrices blancas por combates y marcas circulares de mordeduras de tiburones en su dorso.

SOPLO



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Datos insuficientes. Su conservación depende del avance del conocimiento científico y la protección de hábitats profundos.



ECOLOGÍA


Alimentación: principalmente de calamares  y peces. 

Comportamiento: tienden a formar pequeños grupos de entre 3 y 10 individuos, de hembras con sus crías y un macho adulto. Adoptan diversos comportamientos sociales, como saltar, espiar y batir la cola, que a menudo se observan en pequeños grupos que salen a la superficie muy juntos



DISTRIBUCIÓN

En España, sus avistamientos son raros y se limitan principalmente al norte de la Península (Galicia y Cantábrico), donde las aguas son más profundas y frías. También tiene presencia en Canarias.



Amenazas

Enredos en redes de pesca



Contaminación marina



Ruido submarino



DATOS CURIOSOS

 Durante mucho tiempo, esta especie fue conocida únicamente por restos y varamientos, lo que reforzó su imagen de habitante casi invisible del océano profundo, apenas presente en la memoria colectiva humana. Fue el primer zifio descrito para la ciencia a principios del siglo XIX. Se le llama así en honor al naturalista e ilustrador James Sowerby, quien lo describió originalmente.



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

